



கம்பு நேப்பியர் ஓட்டுப்புல் கோ (சி என்) 4

Cumbu Napier hybrid grass Co (CN) 4



பெற்றோர் : தீவனக்கம்பு (கோ 8) x நேப்பியர் புல் (எஃப்டி 46)

Parentage : Cumbu (CO8) x Napier grass (FD461)

வயது / பருவம் : பல்லாண்டுப் பயிர்

Duration / Season : Perennial

பசுந்தீவன மக்குல் : 400 டன்கள்/எக்டர் / ஆண்டு ஆண்டுக்கு 7 அறுவடைகள்)

Green fodder yield : 400 t/ha/yr (7harvests)

சிறப்பியல்புகள்
Special features

- அதிக தூர்கள் (30 - 40 தூர்கள்/குத்து)
- Profuse tillering (30-40 clump)
- அதிக இலை தண்டு விகிதம் (0.7)
- More Leaf Stem ratio (0.71)
- புரதச்சத்து (10.71 %)
- Crude protein content (10.71 %)
- அதிக சுவை மற்றும் செரிமானம்
- High palatability and digestibility
- சாயாத தண்மை, மிருதுவான, இனிப்பான சாறு நிறைந்த தண்டுகள்
- Ultra soft juicy stem possessing high brix and non lodging
- பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் அற்றது
- Free from pest and disease
- முதல் அறுவடை 75 - 80 நாட்களில் செய்ய வேண்டும்
- First harvest at 75 - 80 days after planting
- அடுத்ததேத் அறுவடைகள் 45 நாட்கள் தீடவெளியில் செய்ய வேண்டும்
- Subsequent harvest at 45 days interval

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்

தீவனப்பயிர் துறை
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் - 641 003

தொலைபேசி - 0422-661128, மின்னஞ்சல் - forage@tnau.ac.in