



தீவனத்தட்டைப்பயறு கோ (எஃப் சி) 8

Fodder Cowpea CO (FC) 8



- பெற்றோர்** : கோ 5 x என் 331 - சந்ததி வழித் தேர்வு
Parentage : Cross derivative of CO 5 x N 331
வயது / பருவம் : இறவைப்பயிராக ஆண்டு முழுவதும் பயிரிடலாம் மானாவாரி (செப் - அக்டோபர்)
Duration / Season : Throughout the year under irrigated conditions Rainfed (Sep - October)
பசுந்தீவன மகசூல் : 25 - 30 டன்கள் / எக்டர்
Green fodder yield : 25 - 30 t/ha

சிறப்பியல்புகள்
Special features

- குருகிய கால தீவன பயிர்
- Short duration crop
- அதிக பசுந்தீவன மகசூல்
- Higher green fodder yield
- அதிக புரதச் சத்து (20.7%) கொழுப்புச்சத்து (2.72%)
- High crude protein (20.7%) Fat (2.72%)
- கால்சியம் (1.49%) மற்றும் நார்ச்சத்து (24.95%)
- Calcium (1.49%) and less fibre (24.95%)
- மஞ்சள் தேமல் மற்றும் வேரழகல் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மை கொண்டது
- Resistant to yellow mosaic virus and root rot
- விதைத்த 50 முதல் 55 நாட்களில் அறுவடை செய்யலாம்
- Harvest on 50-55 days after sowing
- தீவனசோளம் மற்றும் மக்காச்சோளம் போன்ற பயிர்களுடன் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்வதன் மூலம் சமச்சீரான தீவனம் பெறலாம்
- Amenable for mixed cropping with Fodder Sorghum and Maize

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்

தீவனப்பயிர் துறை

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

கோயமுத்தூர் - 641 003

தொலைபேசி - 0422-661128, மின்னஞ்சல் - forage@tnau.ac.in