



மறுதாம்பு தீவனச்சோளம் கோ (எஃப் எஸ்) 29

Multicut Fodder Sorghum CO (FS) 29



- பெற்றோர் : டி என் எஸ் 30 x சூடான புல் - இனக்கலப்பின் மூலம் சந்ததி வழித்தோர்வு
Parentage : Cross derivative of TNS 30 x Sorghum sudanense
வயது / பருவம் : பல்லாண்டுப் பயிர் (ஆண்டு முழுவதும்)
Duration / Season : Perennial crop (Throughout the year)
பசுந்தீவன மகசூல் : 160 - 170Lன்கள்/ எக்டர் / ஆண்டு (ஆண்டுக்கு 6-7 அறுவடைகள்)
Green fodder yield : 160 - 170 t/ha/yr (6-7 harvests/year)

சிறப்பியல்புகள்
Special features

- பல்லாண்டுப் பயிர்
- Perennial crop
- அதிக தூர்கள் (10-15), மிருதுவான தண்டு மற்றும் இலைகள் கொண்டது (80-105)
- Profuse tillering (10 - 15) / soft stem and more number of leaves (80 - 105/clump)
- அதிக செரிக்கும் தன்மை (50.3%)
- High degestibility (IVDMD 50.3%)
- புரதச்சத்து (8.41%) மற்றும் நார்ச்சத்து (24%)
- Crude protein (8.41 %) and less fibre (24%)
- முதல் அறுவடை விதைத்த 65-70 நாட்களில் செய்யலாம்
- First harvest on 65 - 75 days after planting
- அடுத்தடுத்த அறுவடைகள் 50 - 55 நாட்கள் இடைவெளிகளில் பூத்த பின் செய்வது ஏற்றது
- Subsequent harvest at 50 - 55 days interval
- வருடத்திற்கு 6-7 முறை அறுவடை செய்யலாம்
- 6 - 7 harvests/year

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்

தீவனப்பயிர் துறை

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

கோயமுத்தூர் - 641 003

தொலைபேசி - 0422-661128, மின்னஞ்சல் - forage@tnau.ac.in