



# தீவன தட்டைப்பயறு கோ 9

## FODDER COWPEA CO 9



பெற்றோர்	: கோ 5 X புந்தெல் லோபியா 2
வயது/பருவம்	: 50-55 நாட்கள் (தீவனத்திற்கு) ; 90-95 நாட்கள் (விதைக்கு)
பசுந்தீவன மககூல்	: 23 டன்கள்/ ஏக்கர்
Parentage	: CO 5 x Bundel Lobia 2
Duration/Season	: 50-55 days (For fodder) ; 90-95 days (For seed)
Green fodder yield	: 23 t /ha

### சிறப்பியல்புகள்

- ❖ அதிக பசுந்தீவன மற்றும் உலர் எடை மககூல் (23 மற்றும் 3.85 டன்கள்/ஏக்கர்)
- ❖ அகலமான இலைகளுடன் கூடிய அதிக கிளைகள்
- ❖ அதிக புரதச்சத்து (21.56%)
- ❖ குறைந்தளவு நாரச்சத்துக்களை கொண்டு உள்ளதால் அதிக சுவை மற்றும் செரிமானத்திற்கும் ஏதுவாக உள்ளது.
- ❖ மஞ்சள் தேமல் நோய்க்கு ஓரளவு எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது
- ❖ குறைந்த வயதுடையதால் சோளம், மக்காச்சோளம் ஆகியவற்றுடன் கலப்புத் தீவனமாக பயிரிட ஏற்றது

### Special features

- ❖ Higher green fodder and dry matter yield (23 and 3.85 t/ha)
- ❖ More number of branches with broader leaves
- ❖ Higher protein content (21.56%)
- ❖ Reduced fibre portions confer increased digestibility, palatability and intake rate
- ❖ Moderately resistant to yellow mosaic virus and resistant to major pests
- ❖ Shorter in duration; Suited for intercropping with sorghum and maize

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
தீவனப்பயிர் குறை

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் - 641 003  
தொலைபேசி : 0422 - 6611228, மின்னஞ்சல் : forage@tnau.ac.in

## தீவன தட்டைப்பயறு கோ 9 சாகுபடி குறிப்புகள்

பருவம்	:	கரீப், ரபி மற்றும் கோடை பருவம்
வயது	:	50-55 நாட்கள் (தீவனத்திற்கு) 90-95 நாட்கள் (விதைக்கு)
முன்செய் நேர்த்தி	:	2 முதல் 3 முறை உழுவு செய்து, நிலத்தை நன்கு பண்படுத்தி 6 மீ கொண்ட பார்கள் 60 செ.மீ இடைவெளியில் அமைக்கவும்
விதையளவு	:	25 கிலோ/எக்டர் 3 பாக்கெட்டுகள் (600 கி) ரைசோபியம் உயிர் உரத்தை அரிசிக் கஞ்சியில் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யவும்
இடைவெளி	:	30 X 15 செ. மீ இடைவெளியில் பங்களின் இரு புறமும் விதைக்க வேண்டும் விதை உற்பத்திக்கு : 60 X 15 செ.மீ
உரஅளவு (எக்டருக்கு)	:	அடியுரம் 25:40:20 கிலோ தழை, மணி மற்றும் சாம்பல்சத்து இடவேண்டும்
பின்செய் நேர்த்தி	:	விதைத்து 15 - 20 நாட்களுக்கு பிறகு களை எடுக்கவும்
நீர்ப்பாசனம்	:	சுமார் 10 நாட்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது தேவையைப் பொறுத்து தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும்
பயிர் பாதுகாப்பு	:	பொதுவாகத் தேவையில்லை. விதை உற்பத்தியின் போது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் தென்பட்டால் கீழ்க்கண்ட பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை எக்டருக்கு 250 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும் மீதைல் டெமட்டான் 25 இ.சி. 500 மி.லி (அ) டைமிதோயேட் 30 இ.சி. 500 மி.லி (அ) பாஸ்பாமிடான் 40 எஸ்.எல். 500 மி.லி
அறுவடை	:	50 விழுக்காடு செடிகள் பூத்தவுடன் (50-55 நாட்கள்) விதை உற்பத்திக்கு : 90 - 95 நாட்கள்
மகசூல்	:	பசுந்தீவன மகசூல் : 23 டன்கள்/எக்டர் விதை மகசூல் : 745 கிலோ/எக்டர்